

garage, vooral in de winter. De ideale temperatuur is tussen de 10 en 18 graden. Indien dit niet mogelijk is, kan u beter de castratie na de winter plannen.

Maak het hok goed schoon en leg kranten of oude handdoeken neer. Stro of zaagsel kan de wond irriteren.

Nog een reden om uw konijn binnen te houden is dat je zo goed kunt opletten of hij weer gaat eten en drinken. Een konijn moet dezelfde dag nog eten. Dit is belangrijk om het maag-darmkanaal in actie te houden. Anders moet u gaan dwang voederen. Dit kan met babyvoeding (Olvarit wortel) of met speciaal voer dat u bij uw dierenarts kan verkrijgen. Bij dwang voederen geeft u met een spuitje regelmatig een beetje voedsel dat aan de zijkant van de mond achter de wang wordt gespoten. Eet uw konijn niet, neem dan contact met ons op.

Na een operatie kan uw konijn waarschijnlijk niet goed uit een flesje drinken. Zorg dus voor een laag bakje met water.

Tot minstens 1 week na de operatie moet u uw konijn binnenhouden, pas hierna mag hij naar zijn eventuele buitenhok. Probeer spelen en overmatig springen te voorkomen in verband met de wondgenezing.

Controleer dagelijks de wonde. Er mag geen bloed uit komen.

Na een week controleren wij graag uw konijn. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

***Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag.***

# Castratie van uw konijn



Ulicotenseweg 32

4861 RT Chaam

Tel: 0161-4960

@: [info@dierenkliniekhettleijdal.nl](mailto:info@dierenkliniekhettleijdal.nl)



*Er zijn verschillende redenen om een konijn te castreren. De belangrijkste reden is het voorkomen van ongewenste nakomelingen. Daarnaast kan castratie bij een konijn positieve effecten hebben op het gedrag.*

## **Gezelschapsdier**

Een konijn is een sociaal dier en gewend om in een groep te leven. Daarom adviseren we om twee konijnen samen te nemen. De beste keus is een voedster (vrouwetje) en een rammelaar (mannetje) samen.

## **Vruchtbaarheid**

Bij deze combinatie is het natuurlijk belangrijk om ongewenste nestjes te voorkomen. Konijnen zijn vruchtbaar vanaf 3-4 maanden. Om ongewenste nakomelingen te voorkomen raden we aan om de dieren vanaf die tijd apart te huisvesten en zo snel mogelijk te laten steriliseren/castreren. Een rammelaar kan gecastreerd worden vanaf een leeftijd van 4 maanden. Een voedster kan gesteriliseerd worden vanaf 6 maanden.

*Let op: Na castratie is uw rammelaar nog zeker 4 weken vruchtbaar. Wilt u geen nestje, houdt uw konijnen dan nog minimaal 4 weken na castratie apart.*

## **Waarom**

- Het voorkomen van ongewenste nakomelingen
- Makkelijker te koppelen met andere konijnen
- Ongewenst, agressief gedrag tegengaan
- Voorkomen van sproeien in huis

## **Castratie**

Rammelaars worden meestal vanaf 4 maanden gecastreerd. Een castratie van een rammelaar is een relatief kleine ingreep.

Konijnen hebben een verhoogd narcose-risico: omdat het relatief kleine dieren zijn, zijn ze gevoeliger voor afkoeling en moeilijker te controleren tijdens de narcose.

Een konijn heeft een bijzondere spijsvertering, wat helaas een zwak punt is. Een konijn mag nooit vasten voor een operatie! Het is van groot belang dat uw konijn voedsel in zijn darmen houdt, het stilliggen van de darmen is levensgevaarlijk voor een konijn. Een konijn kan niet braken (zoals een hond en kat wel kunnen). Daarom vragen we ook om wat voer mee te brengen op de dag van de operatie, zodat uw konijn na de narcose terug kan eten.

Uw konijn wordt na een lichamelijk onderzoek per injectie in slaap gebracht. Daarna krijgt hij

zuurstof via een kapje toegediend en wordt door de anesthesieassistenten nauwlettend in de gaten gehouden. Voordat de operatie begint krijgt het konijn een pijnstillende injectie. Castratie houdt in dat de zaadballen en een stukje zaadleider worden verwijderd via twee kleine sneetjes op de balzak. De huid wordt onderhuids gehecht met oplosbaar hechtmateriaal en eventueel lijmen we de huid van het konijn om te voorkomen dat het konijn aan de hechtingen kan zitten.

## **Nazorg op de praktijk**

Na de narcose zorgen we er met een warmtelamp voor dat de lichaamstemperatuur op peil blijft. Na de operatie krijgt uw konijn een injectie om de narcose ongedaan te maken.

## **Nazorg thuis**

Dezelfde dag kan het konijn naar huis. Als u uw konijn weer op komt halen krijgt u pijnstillers mee.

Elk geopereerd konijn moet na een operatie binnenshuis gehouden worden. Het dier heeft een warme plek nodig. Na een narcose kan uw konijn moeilijk zijn lichaamstemperatuur op peil houden, en loopt het gevaar te onderkoelen. Als uw konijn gewend is om buiten te zitten, houdt het dan toch het liefst in bv een schuurtje of een